

Mar-V

Cloruro de Sodio 0.65%

Solución Isotónica Abufferada

Industria Argentina | Venta bajo receta

FÓRMULA

Cada 100 ml contiene **Cloruro de sodio** 650 mg. Excipientes: Bicarbonato de sodio, Cloruro de benzalconio, Agua purificada.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Fluidificador de las secreciones del árbol respiratorio.

INDICACIONES

Rinitis, rinosinusitis, fluidificación de secreciones bronquiales.

ACCIÓN FARMACOLÓGICA

Mar-V actúa localmente favoreciendo la licuación y remoción de mucus y costras en afecciones del tracto respiratorio.

FARMACOCINÉTICA

Mar-V actúa localmente y externamente sin absorberse y se elimina por mecanismos fisiológicos broncorespiratorios.

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN – POSOLOGÍA HABITUAL

- a) Nebulizaciones (sólo o como vehículo) 2 a 5 ml. Nebulización con vaporizador (2 a 4 golpes de vaporizador).
- b) Instilación nasal: 2 a 4 gotas, 3 a 4 veces por día.

DURACIÓN DE TRATAMIENTO

Según criterio médico.

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Exclusivamente local (en nebulización o instilación nasal).

DOSIS MÍNIMA Y MÁXIMA

- Dosis mínima instilación: 1 gota
- Dosis máxima instilación: 4 gotas
- Dosis mínima para nebulización: 1 ml
- Dosis máxima para nebulización: 5 ml

INSTRUCCIONES DE USO

Nebulizaciones: Usar el gotero dosificador para llenar con la cantidad adecuada el dispositivo para nebulizaciones. **Instilación nasal:** Instilar la dosis adecuada con el gotero o, en caso de usar el aplicador nasal, destapar el frasco, colocar el aplicador y purgarlo antes de usar.

MÉTODO DE PREPARACIÓN

Solución ya preparada.

CONTRAINDICACIONES

No se conocen.

ADVERTENCIAS

No apto para uso parenteral.

PRECAUCIONES

No usar como inyectable.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

No se conocen.

INTERACCIÓN E INFLUENCIA SOBRE PRUEBAS DE LABORATORIO

No se conocen.

CARCINOGENESIS, MUTAGÉNESIS, TRASTORNOS DE FERTILIDAD

No se conocen.

EMBARAZO – EFECTOS TERATOGÉNICOS

No se conocen efectos deletéreos sobre embarazo ni teratogénicos. *Trabajo de parto y alumbramiento:* No afecta.

EXCRECIÓN EN LECHE MATERNA

No detectable.

EMPLEO EN PEDIATRÍA

Nebulizaciones: 2 ml / nebulizar ya sea solo o como vehículo de otras sustancias.

Instilación nasal: 2 gotas en cada fosa 3 a 4 veces por día.

EMPLEO EN ANCIANOS

Sin contraindicaciones. Usar dosis similar a adultos.

EMPLEO EN INSUFICIENCIA HEPÁTICA Y RENAL

Sin restricciones.

REACCIONES ADVERSAS

No se han comunicado hasta el momento.

SISTEMAS Y ÓRGANOS

Mar-V actúa localmente por lo que no afecta los órganos y sistemas de la economía salvo la acción terapéutica sobre el tracto respiratorio.

SEVERIDAD DE LOS SÍNTOMAS

No se han descrito efectos adversos de ningún tipo ni severidad. Por esta razón no hay distribución de frecuencia.

SOBREDOSIFICACIÓN

No se han descrito. Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología: Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez (011) 4962-6666 /2247. Hospital A. Posadas (011) 4654-6648 y 4658-7777.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Conservar en lugar seco y fresco entre 15°C y 30°C.

Mantener en su envase original hasta su utilización.

Elaborado en Dr. Luis Belaustegui 2957, C1416CZ1,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Dirección Técnica: María Eugenia Belgiorno - Farmacéutica.
Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado N° 52.489

Siegfried S.A. Carlos Calvo 2756, C1230AAT, C.A.B.A.

Información a profesionales y usuarios: 0810-333-5431

www.siegfried.com.ar

Fecha de última revisión: Septiembre 2005



3071601840 AS0765 0223 103/L351

