

Micomazol B

Clotrimazol / Betametasona

Uso externo

Crema

Industria Argentina | Venta bajo receta

FÓRMULA

Cada 100 g de crema contiene: **Clotrimazol** 1 g; **Betametasona dipropionato** 64 mg (equivalente a 50 mg de Betametasona). Excipientes: Monoestearato de etilenglicol, Glicerina, Propilenglicol, Vaselina líquida, Alcohol bencílico, Monoestearato de sorbitán, Alcohol cetosteárico autoemulsionable, Trietanolamina, Agua purificada.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antimicótico, antiinflamatorio.

INDICACIONES DE USO

Micomazol B está indicado en el tratamiento tópico de las siguientes enfermedades dérmicas: Candidiasis debido a *Cándida albicans*; Tinea versicolor debida a *Malassezia furfur*; Tinea pedis, Tinea cruris y Tinea corporis debidas a *Tricofitum rubrum*, *Tricofitum mentagrofites*, *Epidermofitum floccosum* y *Microsporum canis*.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Aplicar una cantidad suficiente sobre el área afectada y su zona circundante, frotando suavemente. Debe aplicarse dos veces por día, durante la mañana y la noche, a lo largo de 2 semanas en la tiña crural, tiña corporal y Candidiasis; y durante cuatro semanas en la tiña podal.

ACIONES COLATERALES Y SECUNDARIAS

Urticaria macropapular, edema e infecciones secundarias por gérmenes no sensibles. Parestesia. Reacciones adversas locales propias del uso de corticoides por vía dérmica, tales como ardor, picazón, sequedad de la piel, hipertrichosis, erupciones acneiformes, hipopigmentación, dermatitis, atrofia de la piel, estrías.

CONTRAINDICACIONES

Micomazol B está contraindicado en pacientes sensibles al Clotrimazol, a Betametasona dipropionato o a otros corticoesteroides o imidazoles o a cualquier componente del producto.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Puede ocurrir absorción sistémica del corticoesteroide, especialmente si se aplica sobre grandes superficies o períodos prolongados.

Los niños pueden absorber cantidades proporcionalmente mayores de corticoesteroides tópicos y por ello ser más susceptibles a la toxicidad sistémica.

No debe usarse con vendaje oclusivo.

Si aparece irritación o hipersensibilidad con el uso de **Micomazol B** debe discontinuarse el tratamiento y aplicar la terapia adecuada.

Si hay infección bacteriana asociada, debe aplicarse un agente bactericida concomitantemente.

Embarazo y lactancia

Por no existir estudios bien controlados que aseguren ausencia de efectos adversos para el feto, este medicamento no debe usarse en mujeres embarazadas o en período de lactancia.

Pediatría

No se ha establecido seguridad de uso y efectividad en niños menores de 12 años.

La administración a niños de productos dermatológicos tópicos conteniendo un corticoide debe ser

limitada al mínimo posible, compatible con un régimen terapéutico efectivo. Una terapia con corticoesteroides en forma prolongada y reiterada puede interferir con el desarrollo y crecimiento del niño. Este medicamento no se recomienda en dermatitis del pañal.

SOBREDOSIFICACIÓN

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de Toxicología: Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962- 6666 / 2247, Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

PRESENTACIÓN

Envases conteniendo 30 g de crema.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Conservar entre 5°C y 35°C.

Mantener en su envase original hasta su utilización.

Elaborado en Intendente Amaro Avalos 4208, B1605ECT, Munro, Provincia de Buenos Aires.

Dirección Técnica: María Eugenia Belgiorno - Farmacéutica.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 42.480

Siegfried S.A.

Carlos Calvo 2756, C1230AAT, C.A.B.A.

Información a profesionales y usuarios: 0810-333-5431

www.siegfried.com.ar

Fecha de última revisión: Agosto 1993



3018407840 AS0701 1222 9/L86

